

**Solutions finales des exercices du syllabus de préparation aux épreuves d'admission en mathématiques et en physique**

p5 ex1) La dimension d'une position sur la dimension d'un temps - en m/s (mètre par seconde) – une vitesse ou la distance parcourue sur le temps pour la parcourir - 10,8

p6 ex2)

Aire – formule  $r^2$  pour un carré – dimension :  $m^2$

Volume – formule  $r^3$  pour un cube – dimension :  $m^3$

Masse volumique – formule :  $m/V$  – dimension :  $kg/m^3$

Fréquence –  $f = 1/T$  avec  $T$  la période – dimension :  $1/seconde = 1/S = \text{Hertz} = Hz$

p6ex3)  $k$  est en  $m.\text{min}$  ou mètre fois minute – 1/15

p11ex1)

$$v_y = v \cdot \sin \theta = 50 \sin(30^\circ) = 25$$

p11ex2)  $\cos x = 0,6$  ou  $-0,6$

p11ex3) Les 3 angles sont  $\theta$ ,  $\alpha$  et  $90^\circ$

$$\sin \theta = 0,6 \quad \cos \theta = 0,8 \quad \text{et } \tan \theta = 3/4 = 0,75$$

$$\sin \alpha = 0,8 \quad \cos \alpha = 0,6 \quad \text{et } \tan \alpha = 4/3 = 1,33$$

$$\sin 90^\circ = 1 \quad \cos 90^\circ = 0 \quad \text{et } \tan 90^\circ = \infty = \text{infini}$$

p 11ex5) 1,732

p11ex6)  $70,52^\circ$  et  $109,47^\circ$

p14ex1)

$$\begin{aligned} 5\sqrt{2} - 3\sqrt{3} - 3\sqrt{5} - 2\sqrt[3]{9} - 18 + \sqrt{5} - 24 - 13\sqrt{6} - (8/30)a - (3/10)b \\ (2+5x)/(4x) - (-5a-1)/(6a^2+a-1) - (3x-3y-5)/(x^2-y^2) \end{aligned}$$

p16ex4) âge actuel du fils =  $y = 2 + (1/3) \cdot (x-2)$

p19exC) 1) -81 2) +81 3) -81 4) pas de réponse réelle 5) -2 6) +9 ou -9 7) +27 ou -27  
 8) +64 ou -64 9) +16 10)  $a^{-1}$  11)  $b^2/(3a)$  12)  $(1/a) + (1/b)$  ou  $(a+b)/(a.b)$  13) +1 14) +1  
 15) +4 16) +4 17) +1/5 18) -1/5 19) -1/16 20)  $b^m a^n$  21)  $4^{x+3}$  22)  $a+2 + (1/a)$   
 23)  $2 - (a/b^2) - (6/(ab^2)) + (3/b^4)$

p20exC)

$$\begin{aligned} 24) b^2/(3a) & 25) 5 - (6/(ab^2)) - ab^2 & 26) a^{3/4}b & 27) 100\sqrt{10} & 28) 10^4 & 29) 2 \cdot 10^4 = 20000 \\ 30) 9900 & 31) 10^{-11} & 32) \sqrt{2} & 33) -525 & 34) 3 - 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

p24exC)

$$\begin{aligned} 1) 2 \log 2 = 0,602 & 2) \log 10 - \log 2 = 0,7 & 3) \log 2 + \log 3 = 0,778 \\ 4) 1/2 \log 50 = 0,5 \log 100 - 0,5 \log 2 = 0,850 & 5) 3 \log 2 = 0,903 & 6) 2 \log 3 = 0,954 \\ 7) 1 & 8) \log 2 + \log 10 = 1,301 & 9) \log 2 + 2 \log 10 = 2,301 & 10) \log 5 + \log 100 = 2,7 \\ 11) \log 2 - \log 10 = 0,699 & 12) \log 5 - \log 100 = 1,3 & 13) \log 4 - \log 100 = -1,398 \\ 14) \log 8 - \log 1000 = -2,094 & 15) \log 8 - \log 100000 = -4,094 & 16) 10^{1,7} = 50,1 & 17) 10^{2,3} = 200 \\ 18) 0,5 & 19) 0,02 & 20) \text{n'existe pas} & 21) 3/2 \ln e = 1,5 & 22) 2 \ln 10 = 4,6 \\ 23) -1 & 24) -\ln 2 = -0,693 & 25) -\ln 4 = -2 \ln 2 = 1,386 & 26) 2,3 \log 3 = 1,097 \end{aligned}$$

$$27) -1,72 \quad 28) 0,4343 \cdot 2 = 0,8686 \quad 29) -2,3$$

p26ex2) 43 dB

p31ex5) 24m car position  $y = -0,8t + 40$  avec  $t=20s$

p34ex1)

axe de symétrie  $x=+1$

coordonnées de l'extremum :  $y= -8$

p34ex2)

$y=0$  en  $t= 1s$  et en  $t=3s$

$y=$  extremum en  $t=2s$

la courbe coupe l'axe des ordonnées en  $t=0s$